

สถานการณ์โรคเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑

โรคไข้เลือดออก

ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ พบผู้ป่วยจำนวน ๕ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๐.๔๔ ต่อแสนประชากร ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต พบในอำเภอภูเขียว ๒ ราย คอนสวรรค์ เทพสถิต ภูเก็ตชุมพล อำเภอละ ๑ ราย

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๑ จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยจำนวน ๑๐ ราย อัตราป่วย ๐.๘๘ ต่อแสนประชากร กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ ๑. กลุ่มอายุ ๕ - ๙ ปี ๒. กลุ่มอายุ ๐ - ๔ ปี อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ชัยภูมิ รองลงมา คือ ภูเก็ตชุมพล และภูเขียว พื้นที่ที่ยังมีการเกิดโรคใน ๔ สัปดาห์ย้อนหลัง จำนวน ๕ หมู่บ้าน คือ

๑. บ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๙ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
๒. บ้านห้วยเกตุ หมู่ที่ ๒ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
๓. บ้านราษฎร์ภักดี หมู่ที่ ๑๓ ต.เจ้าทอง อ.ภูเก็ตชุมพล
๔. บ้านโนนทัน หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองตม อ.ภูเขียว
๕. บ้านโนนเสลา หมู่ที่ ๖ ต.หนองตม อ.ภูเขียว

ในภาพรวมประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ พบผู้ป่วย ๔,๘๔๗ ราย อัตราป่วย ๗.๔๑ ต่อแสนประชากร เสียชีวิตจำนวน ๘ ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๗ จังหวัดชัยภูมิ พบผู้ป่วยอันดับ ๓ ของเขตบริการสุขภาพที่ ๙ และอันดับที่ ๖๔ ของประเทศ (เรียงจากมากไปหาน้อย)

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ระยะก่อนการระบาด (ม.ค.-เม.ย.)

* สื่อสารความเสี่ยง โดยเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมโรค จัดการสิ่งแวดล้อมไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และผู้นำชุมชนคืนข้อมูลการสุ่มสำรวจค่าดัชนีลูกน้ำฯ ให้ประชาชนทราบ

* การเฝ้าระวังโรค

- เฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, ศาสนสถาน

* การป้องกันโรค

- เน้นการประสานงาน และการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (เน้นสถานที่ ๖ ร. โรงเรียน, โรงเรียน, โรงพยาบาล, โรงงาน, โรงธรรม และโรงแรม)

- รมณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เน้นปฏิบัติตามมาตรการ “ ๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค ” ได้แก่

๑. เก็บบ้านให้สะอาด ๒. เก็บขยะ เศษภาชนะรอบบ้าน ๓. เก็บน้ำ โดยมีปิดฝาให้มิดชิด เพื่อป้องกัน ๓ โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคปวดข้อยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา

- เตรียมความพร้อมทรัพยากร อุปกรณ์ และงบประมาณในการป้องกันควบคุมโรค

* กรณีเกิดโรคให้ดำเนินการ ตามมาตรการ ๓-๓-๑ -๕-๑๔ คือ

๓ : รายงานโรคภายใน ๓ ชั่วโมง

๓ : ควบคุมโรคเร็วภายใน ๓ ชั่วโมง เพื่อตัดวงจรการติดต่อ โดยใช้สเปรย์กระพ่นกำจัดยุงลาย

ฉีดที่บ้านผู้ป่วย และบ้านหลังอื่น ๆ ในรัศมี ๑๐๐ เมตรทันที และปิดอับไว้ ๑๕ - ๒๐ นาที เพื่อให้ยุงลายตายแน่นอน

๑ วันถัดไป : ควบคุมตัดวงจรการแพร่กระจายเชื้อไข้เลือดออกในชุมชน รมณรงค์กำจัดแหล่ง

เพาะพันธุ์ลูกน้ำปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนให้ค่าดัชนีลูกน้ำเป็น ๐ พ่นสารเคมีในวงกว้างครอบคลุมทั้งชุมชน

๕ วัน : ภายใน ๕ วัน ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์

๑๔ วัน : ไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ หลัง ๑๔ วัน